

## 8 臨床試験

Disease	Target	Drug	Phase	評価 病変	Group or company	備考	担当	No	IRB	登録数
cervix (adeno)	術後非扁平上皮癌 (Ib2-II 期)	DC or TC	II	要	TGCU, SGSG	SGSG008	庄子	26	済	0
cervix (adeno)	進行 (IVb 期), 再発非 扁平上皮癌	DOC+ CBDCA	II	要	TGCU, SGSG	SGSG006	高野	18	済	3
cervix (adeno)	細胞診 AGC	LEEP	観察	不要	GOG Japan	GOG237	高野	31	済	0
cervix (SCC)	術後扁平上皮癌 (Ib-IIa 期), リンパ節転移	CPT+ NDP	II	不要	JGOG	JGOG1067	高野	33	済	0
cervix (Any Type)	Ib2-IVa 期 CCRT にて PR 以上の効果, 遠隔転 移なし	UFT vs Obs	III	不要	GOTIC Inter Group	LUFT, GOTIC002	大槻	40	済	0
cervix (Any Type)	Ib1-IIa 期広汎子宮全摘 後, 再発中等度リスク群	RT vs CCRT	III	不要	GOG Japan	GOG263	大槻	38	済	1
leiomyo- sarcoma	測定可能病変のある I~IV 期, 再発例	DOC+ GEM	I/II	要	TGCU, Inter Group	TRセンター, 保留中	高野		保留	
ovary	術前臨床診断 III 期, IV 期 (脳・骨・骨髄転移 除く)	Op vs TC(NAC) Op	III	要	JCOG	JCOG0602	高野	17	済	0
ovary	測定可能な病変をもつ 悪性卵巣間質性腫瘍患 者 (2nd line)	T 単剤	II	要	GOG Japan	GOG187	高野	32	済	1
ovary	進行・再発・転移性粘 液性腺癌	S-1+ I-OHP	II	要	TGCU, 鳥取大学	MOST	高野	27	済	0
ovary	再発卵巣がん, ドキシル サポータティブケア (口 内炎)	Doxil	II	不要	TGCU, 鳥取大学		高野	39	済	0
ovary	プラチナ耐性再発癌	Doxil/ CPT11	I/II	要	TGCU	レベル 4	大槻	36	済	0
ovary, tube, peritonem	プラチナ耐性タキサン 既治療再発癌	CPT11+ VP16po	II	要	JCOG	JCOG0503	高野	28	済	4

ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌 測定可能・不能病変, CA125再発	TC± Bevacizumab	III	要	GOG Japan	GOG213, 高度医療	大槻	30	済	4
ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌 (非粘液性) 測定可能病 変要	TC± MORAb	III	要	エーザイ	MORAb003, 治験	大槻		済	3
ovary, tube, peritoneum	プラチナ耐性再発癌	Doxil40/ 50mg/m <sup>2</sup>	III	不要	JGOG	JGOG3018	大槻	34	済	0
ovary, tube, peritoneum	術前臨床診断Ⅱ－Ⅳ期	ddTC ip vs. iv	III	不要	JGOG	JGOG3019, 高度医療	大槻	37	済	2
ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌 測定可能・不能病変	PLDC vs GC	II	要	Inter- group	iPLAS	大槻		済	0
Chemo- therapy	CDDP50mg/m <sup>2</sup> 以上を 含む化学療法	イメンド, アロキシ, デキサート	II	不要	KCOG	KCOG1003	徳永	41	済	0