

9 臨床試験

Disease	Target	Drug	Phase	評価 病変	Group or company	備考	担当	No	IRB	登録数
cervix (adeno)	術後非扁平上皮癌 (Ib2-II 期)	DC or TC	II	要	TGCU, SGSG	SGSG008	庄子	26	済	6
cervix (adeno)	進行 (IVb 期), 再発非扁平上皮癌	DOC+ CBDCA	II	要	TGCU, SGSG	SGSG006	高野	18	済	7
cervix (adeno)	細胞診 AGC	LEEP	観察	不要	GOG Japan	GOG237	高野	31	済	1
cervix (CIN-Ca)	子宮頸癌, CIN, AIS	HPVDNA ^{tying}	観察	無	国際科学 振興財団	MINT project	永瀬	57	済	16
cervix (Any Type)	Ib2-IVa 期 CCRT にて PR 以上の効果, 遠隔転移なし	UFT vs Obs	III	不要	GOTIC Inter Group	LUFT, GOTIC002	大槻	40	済	1
cervix (Any Type)	Ib1-IIa 期 広汎子宮全摘 後, 再発中等度リスク 群	RT vs CCRT	III	不要	GOG Japan	GOG263	大槻	38	済	3
leiomyo- sarcoma	測定可能病変のある I~ IV 期, 再発例	DOC+ GEM	I/II	要	TGCU, Inter Group	TRセンター, 保留中	高野		保留	
ovary	術前臨床診断 III 期, IV 期 (脳・骨・骨髄転移除 く)	Op vs TC (NAC) Op	III	要	JCOG	JCOG0602	高野	17	済	0
ovary	測定可能な病変をもつ 悪性卵巣間質性腫瘍患 者 (2nd line)	T 単剤	II	要	GOG Japan	GOG187	高野	32	済	1
ovary	進行・再発・転移性粘 液性腺癌	S-1+ I-OHP	II	要	TGCU, 鳥取大学	MOST	高野	27	済	0
ovary	再発卵巣がん, ドキシル サポーティブケア (口内 炎)	Doxil	II	不要	TGCU, 鳥取大学		高野	39	済	0
ovary	III-IV 期 明細胞腺癌, 手術後初回治療	TC+ Temsirolimus	II	要	GOG Japan	GOG0268 医師主導治験	高野	48	済	4
ovary	プラチナ耐性再発癌	Doxil/ CPT11	I/II	要	TGCU	レベル 4	大槻	36	済	1
ovary, tube, peritonem	プラチナ耐性タキサン 既治療再発癌	CPT11+ VP16po	II	要	JCOG	JCOG0503	高野	28	済	4

ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌 測定可能・不能病変, CA125再発	TC± Bevacizumab	III	要	GOG Japan	GOG213, 高度医療	大槻	30	済	5
ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌 (非粘液性) 測定可能病 変要	TC± MORAb	III	要	エーザイ	MORAb003, 治験	大槻		済	3
ovary, tube, peritoneum	プラチナ耐性再発癌	Doxil40/ 50mg/m ²	III	不要	JGOG	JGOG3018	大槻	34	済	1
ovary, tube, peritoneum	術前臨床診断Ⅱ－Ⅳ期	ddTC ip vs. iv	III	不要	JGOG	JGOG3019, 高度医療	大槻	37	済	3
ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌 測定可能・不能病変	PLDC vs GC	II	要	Inter- group	iPLAS	大槻		済	0
Chemo- therapy	CDDP50mg/m ² 以上を 含む化学療法	イメンド, アロキシ, デキサート	II	不要	KCOG	KCOG1003	徳永	41	済	0
子宮頸部粘液性腺癌「胃型腺癌」調査										
ハイカムチン使用後調査										
卵巣癌再発時期における予後の比較										
卵管悪性腫瘍の予後解析										
卵巣漿液性境界悪性腫瘍の病態と臨床的取り扱いに関する調査研究										
タコシール使用後調査										