

9 臨床試験

Disease	Target	Drug	Phase	評価 病変	Group or company	備考	担当	No	IRB	登録数
cervix (adeno)	術後非扁平上皮癌 (Ib2-II期)	DC or TC	II	要	TGCU, SGSG	SGSG008	庄子	26	済	6
cervix (adeno)	進行 (IVb期), 再発非扁平上皮癌	DOC + CBDCA	II	要	TGCU, SGSG	SGSG006	高野	18	済	7
cervix (adeno)	細胞診 AGC	LEEP	観察	不要	GOG Japan	GOG237	高野	31	済	1
cervix (CIN-Ca)	子宮頸癌, CIN, AIS	HPVDNA _{tying}	観察	無	国際科学 振興財団	MINT project	永瀬	57	済	25
cervix (Any Type)	Ib2-IVa期CCRTにてPR 以上の効果, 遠隔転移なし	UFT vs Obs	III	不要	GOTIC Inter Group	LUFT, GOTIC002	高野	40	済	1
cervix (Any Type)	Ib1-IIa期広汎子宮全摘 後, 再発中等度リスク群	RT vs CCRT	III	不要	GOG Japan	GOG263	高野	38	済	3
leiomyo- sarcoma	測定可能病変のあるI~ IV期, 再発例	DOC + GEM	I/II	要	TGCU, Inter Group	TRセンター, 保留中	高野		保留	
ovary, tube, peritoneum	余命3カ月以上, 再発ま たは進行性化学療法の前 定	QOL前向 き調査		不要	ANZGOG	ANZGOG0701	高野	66	済	1
ovary	III-IV期明細胞腺癌, 手術後初回治療	TC+ Temsirrolimus	II	要	GOG Japan	GOG0268 医師主導治 験	高野	48	済	5
ovary	プラチナ耐性再発癌	Doxil/ CPT11	I/II	要	TGCU	レベル4	高野	36	済	1
ovary, tube, peritoneum	プラチナ耐性タキサン既 治療再発癌	CPT11+ VP16po	II	要	JCOG	JCOG0503	高野	28	済	4
ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌測 定可能・不能病変, CA125 再発	TC± Bevacizumab	III	要	GOG Japan	GOG213, 高度医療	高野	30	済	5
ovary, tube, peritoneum	プラチナ耐性再発癌	Doxil40/ 50mg/m ²	III	不要	JGOG	JGOG3018	大槻	34	済	1

ovary, tube, peritoneum	術前臨床診断Ⅱ－Ⅳ期	ddTC ip vs. iv	Ⅲ	不要	JGOG	JGOG3019, 高度医療	高野	37	済	3
ovary, tube, peritoneum	プラチナ感受性再発癌測定可能・不能病変	PLDC vs GC	Ⅱ	要	Inter- group	iPLAS	大槻		済	0
Chemotherapy	CDDP50 mg/m ² 以上を含む化学療法	イメンド, アロキシ, デキサート	Ⅱ	不要	KCOG	KCOG1003	徳永	41	済	5
body (low risk GTN)	FIGO進行期Ⅰ～Ⅲ	Acd vs MTX	Ⅲ	要	GOG	GOG 0275	高野	70	済	0
子宮頸部粘液性腺癌「胃型腺癌」調査（35例）										
ハイカムチン使用後調査（3例）										
卵巣癌再発時期における予後の比較（29例）										
卵管悪性腫瘍の予後解析（7例）										
卵巣漿液性境界悪性腫瘍の病態と臨床的取り扱いに関する調査研究（12例）										
タコシール使用後調査（5例）										
癌化学療法後の悪心・嘔吐の観察調査（20例）										
予後不良組織型子宮体がん（漿液性腺癌）についての調査研究（20例）										
子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術後の合併症，後遺症に関する調査（10例）										
子宮頸部扁平上皮癌Ⅰa2期における縮小手術の可能性を検討するための観察研究（103例）										
再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療法に関する調査研究（101例）										
子宮癌肉腫調査（14例）										
外陰及び膣の悪性腫の予後解析 48例+27例										
子宮頸がん CCRT による有害事象（25例）										